



MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA

2016/2017

Sara Alexandra Gomes Rodrigues
Colecistostomia percutânea no tratamento da colecistite aguda/
Percutaneous cholecystostomy in the management of acute cholecystitis

março, 2017

FMUP

Sara Alexandra Gomes Rodrigues
Colecistostomia percutânea no tratamento da colecistite aguda /
Percutaneous cholecystostomy in
the management of acute cholecystitis

Mestrado Integrado em Medicina

Área: Cirurgia Geral
Tipologia: Dissertação

Trabalho efetuado sob a Orientação de:
Dr. Rui Mendes Costa

Trabalho organizado de acordo com as normas da revista:
Revista Portuguesa de Cirurgia

março, 2017

FMUP

Eu, Sara Alexandra Gomes Rodrigues, abaixo assinado, nº mecanográfico 201108642, estudante do 6º ano do Ciclo de Estudos Integrado em Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste projeto de opção.

Neste sentido, confirmo que **NÃO** incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual, ou partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores, foram referenciadas, ou redigidas com novas palavras, tendo colocado, neste caso, a citação da fonte bibliográfica.

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 22 / 03 / 2017

Assinatura conforme cartão de identificação:

Sara Alexandra Gomes Rodrigues.

Projecto de Opção do 6º ano – DECLARAÇÃO DE REPRODUÇÃO

NOME

SARA ALEXANDRA GOMES RODRIGUES

NÚMERO DE ESTUDANTE

201108642

DATA DE CONCLUSÃO

22/03/2017

DESIGNAÇÃO DA ÁREA DO PROJECTO

CIRURGIA GERAL

TÍTULO DISSERTAÇÃO/MONOGRAFIA (riscar o que não interessa)

COLECISTOSTOMIA PERCUTÂNEA NO TRATAMENTO DA COLECISTITE ABUDA

ORIENTADOR

DR. RUI MENDES COSTA

COORIENTADOR (se aplicável)

—

ASSINALE APENAS UMA DAS OPÇÕES:

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTE TRABALHO APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE.	<input checked="" type="checkbox"/>
É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE TRABALHO (INDICAR, CASO TAL SEJA NECESSÁRIO, Nº MÁXIMO DE PÁGINAS, ILUSTRAÇÕES, GRÁFICOS, ETC.) APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE.	<input type="checkbox"/>
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, (INDICAR, CASO TAL SEJA NECESSÁRIO, Nº MÁXIMO DE PÁGINAS, ILUSTRAÇÕES, GRÁFICOS, ETC.) NÃO É PERMITIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER PARTE DESTE TRABALHO.	<input type="checkbox"/>

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 22/03/17

Assinatura conforme cartão de identificação: Sara Alexandra Gomes Rodrigues.

Aos meus pais
e avós

Colecistostomia percutânea no tratamento da colecistite aguda litiásica

Percutaneous cholecystostomy in the management of calculous acute cholecystitis

AUTORES:

Sara Gomes-Rodrigues¹, Telma Vale-Fonseca^{1,2}, Rui Mendes Costa^{1,2}

¹ Faculty of Medicine of University of Porto. Porto. Portugal

² Department of General Surgery. Hospital of São João. Porto. Portugal

AUTOR CORRESPONDENTE:

Sara Rodrigues

Morada: Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200–319 Porto Portugal

E-mail: sara.gomes.rodrigues@gmail.com

Colecistostomia percutânea no tratamento da colecistite aguda litiásica

Percutaneous cholecystostomy in the management of calculous acute cholecystitis

Abstract

Background: Laparoscopic cholecystectomy is the gold-standard treatment in acute cholecystitis. However, percutaneous cholecystostomy stands as an alternative therapeutic approach among the elderly or patients with several comorbidities.

Objective: The aim of this study is to clarify the role of percutaneous cholecystostomy in calculous acute cholecystitis treatment and to elucidate about its association with the surgical treatment.

Methods: In December 2016, a systematic database search on PubMed, Scopus and Web of Science was conducted to identify articles on percutaneous cholecystostomy published from January 2013 to November 2016, using the query “(acute cholecystitis OR severe cholecystitis) AND (cholecystostomy OR percutaneous cholecystostomy OR cholecystostomy tube)”. In total, 290 articles were found and then submitted to inclusion and exclusion criteria.

Results: A total of 13 records involving 1130 patients from 10 different countries met all inclusion criteria and were therefore included in this systematic review. All studies found eligible concluded percutaneous cholecystostomy is a potentially safe and effective therapeutic approach among high-risk surgical patients in the setting of acute cholecystitis. Percentage of patients undergoing percutaneous cholecystostomy followed by cholecystectomy varied between 7.2% and a maximum of 66.7%, with a conversion rate fluctuating between 0.0% and 66.7%. Complication and mortality rates ranged from 2.2% to 41.7% and 0.0% and 43.2%, respectively.

Conclusions: Percutaneous cholecystostomy is generally considered safe and effective among high-risk surgical patients diagnosed with acute cholecystitis.

Keywords: Cholecystostomy; Cholecystitis, Acute; Cholecystectomy

Introduction

Acute cholecystitis, an inflammatory condition affecting the gallbladder, mainly associated to lithiasis, stands as one of the most relevant surgical causes of emergency hospital admissions^{1,2}.

Laparoscopic cholecystectomy has been defined as the gold-standard therapeutic approach, with recommendations highlighting the importance of an early surgical intervention as soon as the diagnosis is established³.

While very common, acute cholecystitis in the elderly and comorbid populations may have an atypical symptomatic presentation and further complicate, prompting difficult surgical treatment⁴. Agnieszka Popowicz et al. point out early cholecystectomy in high-risk patients might be associated with significant morbidity and mortality⁵. In fact, the intrinsic vulnerability of patients of an advanced age and several comorbidities may negatively impact on surgical outcomes, with perioperative morbidity and mortality rising up to 41% and 18%, respectively¹.

Pioneered by R.W. Radder in the 80s⁵, ultrasound-guided percutaneous cholecystostomy consists of a minimally invasive procedure under local anaesthesia, and is generally considered safe^{5,6}.

According to Wang et al., symptomatic relief up until 72 hours has been registered among more than 80% of patients submitted to cholecystostomy, as well as a procedure-associated mortality being inferior to 3%¹. Therefore, percutaneous cholecystostomy may play an increasingly important role in treating severe acute cholecystitis diagnosed in high-risk surgical patients, with substantial co-morbidities⁶. Moreover, performing percutaneous cholecystostomy in patients not eligible for surgery at the time of diagnosis may not only serve as bridging therapeutic approach between medical treatment and surgery, but also as a potentially definitive treatment measure⁵. Indeed, Ye Rim Chang et al. indicate 88.3% of high-risk surgical patients who underwent percutaneous cholecystostomy showed no relapse during a follow-up period of almost two years⁷.

Notably, the procedure has been applied to decreasingly co-morbid patients recently^{1,8}. In fact, comparing trends of percutaneous cholecystostomy use, Travis Smith et. al reveal only ASA III and IV patients were

submitted to drainage the decade before 1995, whereas only 80% were received such high ASA classifications when receiving the procedure the decade after⁸, with mortalities having dropped from 22.1% to 13.3% since that time⁸. Such improved mortality rate may put in evidence the importance of patient selection when deciding on cholecystostomy indication⁸.

However, the role of cholecystostomy as an alternative treatment option to early cholecystectomy remains poorly established⁵. Campanile et al. enhance the need of further investigation on the field in order to clarify its importance and indication criteria, given the heterogeneity in defining high-risk surgical patients³. Besides, literature is not consensual regarding performance of an elective laparoscopic cholecystectomy subsequently to percutaneous cholecystostomy, nor as far as the precise time interval between drainage and surgery is concerned³.

According to the widely used 2013 Tokyo Guidelines, severe acute cholecystitis cases treated with percutaneous cholecystostomy must be only submitted to cholecystectomy three months later⁶. Yet, different studies highlight the advantages of early surgery even in patients of worse surgical profiles. In a systematic review published in 2009, Windbladh et al. describe higher post-cholecystostomy mortality when compared to early cholecystectomy in non-surgical patients, again emphasizing the need of clinical trials on the subject⁹. Moreover, Campanile et al. claim in-hospital mortality associated with cholecystostomy is said to vary between 4 and 50%, signalling study limitations on this matter and how each investigation might define high-risk surgical individuals in divergent manners³. Also, need for surgery has been less investigated than conservative management, particularly in high surgical risk patients³.

Given the absence of consistent evidence in literature on how and when to recommend percutaneous cholecystostomy in the treatment of acute cholecystitis, this systematic review aims to help validate this procedure as a therapeutic approach, to precise its potential indications and to clarify its association with the surgical treatment.

Methods

In December 2016, a literature search was performed to identify studies focusing on the role of percutaneous cholecystostomy as a treatment option for acute cholecystitis.

A systematic search on PubMed, Scopus and Web of Science was conducted spanning from January 2013 to November 2016. Studies were identified using the following query: “(acute cholecystitis OR severe cholecystitis) AND (cholecystostomy OR percutaneous cholecystostomy OR cholecystostomy tube)”. Only studies in humans were considered.

A total of 290 articles were initially retrieved, 110 from PubMed, 25 from Scopus and 155 from Web of Science. Repeated articles among different databases were excluded, remaining 167 records for assessment. Reference lists of eligible articles were hand-searched.

All articles written in languages other than Portuguese or English were excluded, as well as reviews, clinical cases, editor letters or video articles. Additionally, articles about acute acalculous cholecystitis or other conditions other than acute cholecystitis or associated with a malignant etiology were also excluded. Finally, studies involving less than thirty patients were considered small unrepresentative sample populations, having been set aside too. Therefore, from 167 records assessed, 36 full-text articles were assessed for eligibility.

Inclusion criteria were as it follows: populations which were fully characterized according to gender, mean age and American Society of Anaesthesiologists (ASA) physical status classification system, further including information on percutaneous cholecystostomy indication, outcomes of percutaneous cholecystostomy, outcomes of an eventual procedure of cholecystectomy following percutaneous cholecystostomy, procedure-associated complications, global mortality and eventual re-admissions.

Following these criteria, 23 from 36 studies were excluded, and the remaining 13 papers were included in this systematic review. All sequential steps comprising the abovementioned process are depicted in Figure 1.

Results

Among 13 articles found eligible, all studies stressed the effectiveness and safety of percutaneous cholecystostomy as a symptomatic therapeutic approach among high-risk patients, as in bearing less favourable surgical profiles.

A total of 1130 patients prevenient from 10 different countries were counted. Characterization of all 13 study populations is depicted in Table 1, reported outcomes are covered by Table 2 and specific considerations made about each study were as it follows.

Travis J. Smith et al. described an association between percutaneous cholecystostomy tubes placement and elderly age and increased number of comorbidities⁸, namely cardiovascular disease (66% vs 26%, p = 0.001), diabetes (27% vs 13%, p = 0.001), and mean Charlson comorbidity index (3.27 vs 1.07, P = 0.001). Retrospectively comparing trends of cholecystostomy performance during the 90s versus the 00s, authors also observed global decreasing mortality rates⁸, with mortality at 30-day follow-up lowering from 36% to 12% among patients submitted to drainage (p = 0.001).

According to Chung-Kai Chou et al., patients diagnosed with acute severe cholecystitis who were considered unfit for surgery and underwent early percutaneous cholecystostomy showed declining hospital length of stay (15.8 ± 12.9 vs 21.0 ± 17.5 days in patients with late procedure) and procedure-related bleeding (0.0% vs 5.0%, p = 0.018)¹⁰.

Asgaut Viste et al. highlight only minor complications related to the procedure (reported among 12.5% patients) with predominant successful tube insertion and rapid symptom relief experienced in 97% of individuals who enrolled in the study¹¹. E. Atar et al. put in evidence very satisfying rates of technically successful procedures, with effective tube insertion among all 81 critically ill patients and no reports of major complication events¹².

Furthermore, cholecystostomy showed to improve survival among high-risk individuals included in a study led by Charleen Shan Wen Yeo et al., with emphasis on the importance of early procedure for outcome

improvement. Indeed, authors describe that cholecystostomy was performed at a median of 2 days after establishing acute cholecystitis diagnosis, avoiding high failure rates mentioned in literature¹³.

As far as how cholecystostomy might be related with subsequent surgery, a Norwegian retrospective analysis conducted by Asgaut Viste et al. concluded that only one-third of 104 patients submitted to percutaneous biliary drainage were later cholecystectomized¹¹. Moreover, Enver Zerem et al. affirm high-risk surgical patients might not even need further treatment once percutaneous cholecystostomy is performed¹⁴. E. Atar et al. also focus on the efficacy of conservatively treating critical patients with acute cholecystitis, stating that surgical outcomes after percutaneous cholecystostomy are superior to those of cholecystectomy only¹². Dividing and comparing patients in two subsets according to their age (group 1 corresponding to non-elderly patients, age ≤ 70 years, and group 2 including all elderly patients, age > 70 years), Wei-Chen Lin et al. conclude high-risk elderly and substantially comorbid patients should be early identified as such and submitted to cholecystostomy, as they may benefit not only from better clinical outcomes, with a decrease in hospital length of time and associated morbidity, but also from better eventual surgical outcomes, enabling effective performance of delayed laparoscopic cholecystectomy¹⁵. Byung Hyo Cha et al. further define percutaneous cholecystostomy as the best definitive therapeutic option for those with acute cholecystitis who are not eligible for surgery at diagnosis, adding that certain cases may be appropriate for safe drainage tube removal¹⁶.

When investigating which post-drainage clinical circumstances might predict eventual later surgery, Won Seok Janga et al. found advanced patient age, higher increased American Society of Anaesthesiologists (ASA) score and history of cerebrovascular accident (CVA) to be statically significant risk factors¹⁷.

Despite all defending cholecystostomy as safe and effective in treating severe cases of acute cholecystitis, five of thirteen studies made remarks on possible conflicts concerning the procedure.

Qingming Ni et al. enhanced the fact that emergent cholecystectomy should be performed in patients eligible for surgery as soon as acute cholecystitis is diagnosed, despite recognizing the role of percutaneous drainage in case of deteriorated clinical status¹⁸.

Even though only a minor part of all patients retrospectively reviewed by Pandanaboyana Sanjay et al. underwent later surgery, authors noted higher risk of conversion to open cholecystectomy among patients who had been submitted to percutaneous cholecystostomy¹⁹. Also, acute cholecystitis recurrence was registered in one in each four patients during study follow-up¹⁹. The study has also put in evidence the correlation between percutaneous cholecystostomy and high mortality rate due to sepsis at hospital admission, as well as 1-year mortality due to other causes unrelated to cholecystostomy¹⁹.

Mehrdad Nikfarjam et al. additionally observed that a substantial proportion of patients required later surgery, with 9 out of 32 patients undergoing surgery at a median of 73 days since drainage²⁰. This particular study also found hypotension and absence of common bile duct filling on initial cholangiography to be independent prognostic factors, associated with long-term survival reduction²⁰.

Further prognostic factors were detected by Khang Wen Pang et al.²¹. In fact, authors predicted an increased cholecystitis recurrence risk among patients presenting with higher alkaline phosphatase (ALP) at hospital admission and patients with acute cholecystitis complicated with acute myocardial infarction (AMI). Therefore, investigators state that these specific groups of patients might benefit from definitive cholecystectomy, while taking part in the consensual opinion that surgical profile should persevere as the major predictive factor for clinical decision²¹.

Discussion

Widely recognized Tokyo Guidelines, recently revised in 2013, have recommended emergent percutaneous cholecystostomy and subsequent interval cholecystectomy for cases of severe acute cholecystitis, classified as grade III and moderate cases, or grade II, only for when patients appear to be refractory to conservative treatment¹³.

All studies included in this review have recognized a global beneficial use of cholecystostomy in selected patients, particularly among those considered non-eligible for cholecystectomy. Indeed, thorough search has put in evidence an historical belief that correlates populations of an advanced age, in critical clinical condition or with several comorbidities with an inappropriate surgical profile. L.R. Jenkinson et al. have previously associated cholecystectomy performed in an elderly subset of patients with morbidity rates of up to 46%^{19,22}. Further claims have reported surgical procedures in acute settings among high-risk individuals lead to up to 4.5% mortality rates along with 41% morbidity cases mainly due to anaesthetic intercurrences and intrinsic severe comordities^{15,23}.

In this demanding clinical context, cholecystostomy emerges as a potentially safe treatment choice for challenging patients, seemingly able to improve both prognosis as a single approach and outcome among cases requiring later cholecystectomy. In fact, symptomatic relief and sepsis treatment have been previously described among 86% of patients submitted to percutaneous drainage^{9,20}. Included in this review, the investigation led by Mehrdad et al. further attest symptomatic treatment and hospital discharge among 91% of patients who underwent cholecystostomy after having been considered unfit for general anaesthesia²⁰.

As mentioned before, all remaining records included corroborate the advantageous indication for this purpose. Moreover, Byung Hyo Cha et al. obtained successful results when focusing on the role of percutaneous cholecystostomy as definitive management of individuals in critical condition, with no recurrences to register and tubes effectively removed in 75.6% of patients¹⁶.

Despite the optimistic outlook, lengthy database searching for this review has revealed several papers which, despite not qualifying for inclusion criteria and therefore having been excluded, demonstrated conflicting evidence on whether percutaneous cholecystostomy or cholecystectomy should be

recommended for better outcomes. A decade long retrospective analysis comprising more than 300 000 patients, conducted in the University of California, San Diego²⁴, found that patients submitted to cholecystostomy displayed lower risk of procedure-associated complications than patients who underwent surgery; however, mortality was reported to be significantly increased among cholecystostomy patients (odds ratio of 5.2, $p < 0.001$), as well as total hospital length of stay and charges associated. Abi-Haidar et al. have also described not only association of percutaneous cholecystostomy with statistically significant longer hospital length of stay ($p < 0.001$), but also increased complication ($p = 0.01$) and hospital readmission rates ($p = 0.006$) when compared to early cholecystectomy, with 21.4% patients having been eventually readmitted²⁵. Researchers add that even laparoscopic cholecystectomy conversion to open procedure, traditionally correlated with quite poor outcome scenarios, showcased better clinical performance, with decreased number of systemic (25.0% vs 43.1%), hepatobiliary (52.8% vs 68.6%) and other (2.8% vs 7.8%) complications comparing to percutaneous cholecystostomy²⁵.

Originally, a table comprising results systematically collected from all thirteen articles was created. However, multiple discrepancies were extensively detected as far as study designs were concerned. In fact, articles differed greatly in patient selection for procedure indication criteria, data collected, clinical outcomes sought and follow-up time. This has occasioned hazardous comparison between results found, thereby impairing further statistical analysis and weakening potential conclusions for cholecystostomy validation in acute cholecystitis treatment.

As it has been previously stated in literature²⁰, It is our opinion that only randomized controlled trials may effectively clarify whether percutaneous cholecystostomy should be relied on to achieve safe and successful acute cholecystitis treatment. If so, clinical criteria should be formally established so as patients benefit from this procedure. Dutch CHOCOLATE (percutaneous cholecystostomy versus laparoscopic cholecystectomy) multicentre randomized controlled trial on acute cholecystitis treatment among surgical high-risk populations may provide the awaited evidence based guidelines on the best therapeutic approach²³.

Conclusions

All studies included in this review affirm percutaneous cholecystostomy is as a safe procedure with largely successful outcomes when performed in high-risk surgical patients with acute cholecystitis, especially those of an advanced age or who bear significant comorbidities. However, further investigation is needed to strengthen evidence on the role of this procedure.

References

1. Wang C, Wu C, Yang JC, Lien W. Long-Term Outcomes of Patients with Acute Cholecystitis after Successful Percutaneous Cholecystostomy Treatment and the Risk Factors for Recurrence : A Decade Experience at a Single Center. 2016. doi:10.1371/journal.pone.0148017.
2. Trial ACC. Early versus Delayed Operation for Acute Cholecystitis A Controlled Clinical Trial. 1970;(July):7-13.
3. Campanile FC, Pisano M, Coccolini F, Catena F, Agresta F, Ansaloni L. Acute cholecystitis : WSES position statement. 2014;1-6.
4. Bergman S, Nadia MA, Vedel I, et al. Recurrence of biliary disease following non-operative management in elderly patients. 2015. doi:10.1007/s00464-015-4098-9.
5. Popowicz A, Lundell L, Gerber P, et al. Cholecystostomy as Bridge to Surgery and as Definitive Treatment or Acute Cholecystectomy in Patients with Acute Cholecystitis. 2016;2016.
6. Jung W, Park D. 급성담낭염으로 경피적 담낭배액술을 시행한 환자에서 담낭절제술 시행의 적절한 시기 | Timing of Cholecystectomy after Percutaneous Cholecystostomy for Acute Cholecystitis. 2015;66(4):209-214.
7. Chang YR, Ahn Y, Jang J. Percutaneous cholecystostomy for acute cholecystitis in patients with high comorbidity and re-evaluation of treatment efficacy. *Surgery*. 2011;155(4):615-622. doi:10.1016/j.surg.2013.12.026.
8. Smith TJ, Manske JG, Mathiason MA, Kallies KJ. Changing Trends and Outcomes in the Use of Percutaneous Cholecystostomy Tubes for Acute Cholecystitis. 2013;257(6). doi:10.1097/SLA.0b013e318274779c.

9. Winbladh A, Gullstrand P, Svanvik J, Sandström P. Systematic review of cholecystostomy as a treatment option in acute cholecystitis. 2009;183-193. doi:10.1111/j.1477-2574.2009.00052.x.
10. Chou C, Lee K, Chan C. Early Percutaneous Cholecystostomy in Severe Acute Cholecystitis Reduces the Complication Rate and Duration of Hospital Stay. 2015;94(27):1-7. doi:10.1097/MD.0000000000001096.
11. Viste A, Jensen D, Angelsen JH, Hoem D. Percutaneous cholecystostomy in acute cholecystitis ; a retrospective analysis of a large series of 104 patients. 2015;2-7. doi:10.1186/s12893-015-0002-8.
12. Atar E, Bachar GN, Berlin S, Neiman C, Bleich-belenky E, Aviv T. Percutaneous cholecystostomy in critically ill patients with acute cholecystitis : Complications and late outcome. *Clin Radiol*. 2014;69(6):e247-e252. doi:10.1016/j.crad.2014.01.012.
13. Shan C, Yeo W, Wei V, Tay Y. Outcomes of percutaneous cholecystostomy and predictors of eventual cholecystectomy. 2016;65-73. doi:10.1002/jhbp.304.
14. Zerem E, Omerovic S. Can Percutaneous Cholecystostomy be a Definitive Management for Acute Cholecystitis in High-risk Patients ? 2014;24(2):187-191.
15. Lin W, Chang C, Chu C. ScienceDirect Percutaneous cholecystostomy for acute cholecystitis in high-risk elderly patients. *Kaohsiung J Med Sci*. 2016;32(10):518-525. doi:10.1016/j.kjms.2016.08.006.
16. Na B, Yoo Y, Mun S, Kim S, Lee H, Choi N. The safety and efficacy of percutaneous transhepatic gallbladder drainage in elderly patients with acute cholecystitis before laparoscopic cholecystectomy. 2015.
17. Seok W, Jun J, Lim U, Ro K. Outcome of conservative percutaneous cholecystostomy in high-risk patients with acute cholecystitis and risk factors leading to surgery. 2014;12-17. doi:10.1007/s00464-014-3961-4.
18. Case AR, Study C. The Efficacy of Percutaneous Transhepatic Gallbladder Drainage on Acute Cholecystitis in High-Risk Elderly Patients Based on the Tokyo Guidelines. 2015;94(34):1-7.

- doi:10.1097/MD.0000000000001442.
19. Sanjay P, Mittapalli D, Marioud A, White RD, Ram R, Alijani A. Clinical outcomes of a percutaneous cholecystostomy for acute cholecystitis : a multicentre analysis. 2013;511-516. doi:10.1111/j.1477-2574.2012.00610.x.
 20. Nikfarjam M, Shen L, Fink MA, et al. Percutaneous Cholecystostomy for Treatment of Acute Cholecystitis in the Era of Early Laparoscopic Cholecystectomy. 2013;23(5):474-480.
 21. Wen K, Chun P, Nigel H, et al. Outcomes of Percutaneous Cholecystostomy for Acute Cholecystitis. *World J Surg*. 2016. doi:10.1007/s00268-016-3585-z.
 22. Jenkinson LR, Donaldson LA. Cholecystectomy in the elderly : a prospective study. 1985;72:220-222.
 23. Kortram K, Ramshorst B Van, Bollen TL, et al. Acute cholecystitis in high risk surgical patients : percutaneous cholecystostomy versus laparoscopic cholecystectomy (CHOCOLATE trial): Study protocol for a randomized controlled trial. 2012;1-7.
 24. Anderson JE, Chang DC, Talamini MA. A nationwide examination of outcomes of percutaneous cholecystostomy compared with cholecystectomy for acute cholecystitis , 1998 – 2010. 2013. doi:10.1007/s00464-013-2924-5.
 25. Critique SI. Revisiting Percutaneous Cholecystostomy for Acute Cholecystitis Based on a 10-Year Experience. 2015;147(5):4-10.

Figures and tables




Figure 1. Flow diagram representing methods for data analysis throughout all phases of this systematic review.

Abovementioned are discriminated all articles found, included and excluded, and exclusion criteria applied. PC, percutaneous cholecystostomy; PC+CCY, percutaneous cholecystostomy followed by cholecystectomy.

<i>Study</i>	<i>Year</i>	<i>Country</i>	<i>Design</i>	<i>Number of patients</i>	<i>F:M</i>	<i>Mean age, years</i>	<i>Number of patients with ASA≥3</i>
<i>Qingming Ni et al.</i>	2015	China	R	62	34:28	72.1	44 (71.0%)
<i>Charleen Shan Wen Yeo et al.</i>	2015	Singapore	R	103	46:57	80 (43-105)	88 (85.4%)
<i>Chung-Kai Chou et al.</i>	2015	Taiwan	R	209	60:149	74.54	200 (95.7%)
<i>Asgaut Viste et al.</i>	2015	Norway	R	104	47:57	73.5 (22-96)	44 (42.3%)
<i>Won Seok Janga et al.</i>	2014	South Korea	R	93	52:41	73.8 ± 12.1	48 (51.6%)
<i>Enver Zerem et al.</i>	2014	Bosnia and Herzegovina	R	36	24:12	75 ± 9.7	25 (72.2%)
<i>E. Atar et al.</i>	2014	Israel	R	81	33:48	82 (47-99)	81 (100%)
<i>Byung Hyo Cha et al.</i>	2014	South Korea	R	82	39: 43	72.1 ± 13.7	82 (100%)
<i>Mehrdad Nikfarjam et al.</i>	2013	Australia	P	32	16:16	78 (45-97)	32 (100%)
<i>Khang Wen Pang et al.</i>	2016	Singapore	R	71	28:43	73 (38-96)	71 (100%)
<i>Wei-Chen Lin et al.</i>	2016	Taiwan	R	61	30:31	80.3 ± 9.3	58 (95.1%)
<i>Pandanaboyana Sanjay et al.</i>	2013	New Zealand	R	53	21:32	74 (14-93)	49 (92.5%)
<i>Travis J. Smith et al.</i>	2013	EUA	R	143	50:93	72.0 ± 13.5	117 (81.8%)

Table 1. Characterization of all 13 study populations according to year of publication, country of origin, design of study

(R - retrospective; P - prospective), number of patients included, female to male ratio (F:M), mean age of patients (in years) and number of patients corresponding to an American Society of Anaesthesiologists (ASA) score equal or superior to 3.

Study	PC only	PC+CCY	Conversion rate	Complications	Mortality	Readmissions
<i>Qingming Ni et al.</i>	36	26 (41.9%)	19.2%	3 (4.8%)	0 (0.0%)	4 (6.4%)
<i>Charleen Shan Wen Yeo et al.</i>	61	42 (40.7%)	15.0%	10 (9.7%)	13 (12.6%)	7 (6.8%)
<i>Chung-Kai Chou et al.</i>	101	95 (45.5%)	-	26 (12.4%)	13 (6.2%)	20 (9.6%)
<i>Asgaut Viste et al.</i>	70	30 (28.8%)	7.7%	13 (12.5%)	4 (3.8%)	0 (0.0%)
<i>Won Seok Janga et al.</i>	31	62 (66.7%)	3.2%	2 (2.2%)	2 (2.2%)	6 (6.5%)
<i>Enver Zerem et al.</i>	23	6 (16.7%)	16.7%	15 (41.7%)	7 (19.4%)	5 (13.9%)
<i>E. Atar et al.</i>	10	36 (44.4%)	11.1%	6 (7.4%)	35 (43.2%)	2 (2.5%)
<i>Byung Hyo Cha et al.</i>	47	35 (42.7%)	0.0%	2 (2.4%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)
<i>Mehrdad Nikfarjam et al.</i>	21	9 (28.1%)	0.0%	6 (18.8%)	3 (9.4%)	14 (43.8%)
<i>Khang Wen Pang et al.</i>	33	32 (45.1%)	11.5%	20 (28.2%)	23 (32.4%)	7 (9.9%)
<i>Wei-Chen Lin et al.</i>	<i>Group 1 (non-elderly)</i>	7	23 (7.2%)	8.7%	5 (15.6%)	2 (6.2%)
	<i>Group 2 (elderly)</i>	19	34 (55.7%)	17.6%	16 (26.2%)	8 (13.1%)
<i>Pandanaboyana Sanjay et al.</i>	23	18 (34.0%)	66.7%	7 (13.2%)	12 (22.6%)	13 (24.5%)
<i>Travis J. Smith et al.</i>	67	59 (41.3%)	14.0%	21 (14.7%)	17 (11.9%)	0 (0.0%)

Table 2. Outcomes of all 13 studies included, i.e. number of patients who underwent percutaneous cholecystostomy only (PC only), number of patients who underwent percutaneous cholecystostomy followed by cholecystectomy (PC+CCY), conversion rate to open cholecystectomy, number of all complications recorded, global mortality observed and number of readmissions registered. Symbol - stands for no information available.

Agradecimentos

Ao meu orientador e, primordialmente, professor de Cirurgia, Dr. Rui Costa, pelo apoio e disponibilidade permanentes ao longo deste processo, pela contribuição para a fundamentação científica deste texto e pelo exemplo profissional e ético de Medicina que motivou a minha escolha para ser a força motriz deste trabalho.

À minha co-orientadora, Dra. Telma Fonseca, pelo papel fundamental que adquiriu no decorrer deste projeto, pela estreita colaboração que comigo estabeleceu, permitindo a familiarização com os múltiplos conceitos que o projeto-opção implica, e pelo companheirismo que voluntariamente demonstrou.

Aos meus sempre presentes colegas de mestrado, Diana, Diogo, Eduardo e Gonçalo, pela amizade, pela companhia diária e pela entreajuda infalível durante seis longos e fantásticos anos de curso.

Ao meu melhor amigo e companheiro de todos os momentos, Diogo, pela tranquilidade que transmite, pelo carinho incondicional e por se ter tornado o meu porto de abrigo.

Aos meus pais e avós, por me terem dado o mundo e serem o meu mundo.

ANEXOS

Normas de Publicação da Revista Portuguesa de Cirurgia

Informação Geral:

A Revista Portuguesa de Cirurgia (RPC) publica trabalhos originais de teor biomédico relacionados com a área de conhecimento da Cirurgia, tendo como objetivo a divulgação do conhecimento científico e a promoção da boa prática médica.

A Revista subscreve os princípios definidos pelo COPE (Committee on Publication Ethics, em www.publicationethics.org) e os requisitos para apresentação de artigos em revistas biomédicas elaboradas pelo International Committee of Medical Journal Editors (em www.ICMJE.org).

A política editorial da Revista incorpora no processo de revisão e publicação as Recomendações de Política Editorial (Editorial Policy Statements) emitidas pelo Council of Science Editors, sobre a responsabilidade e direitos dos editores das revistas com arbitragem científica. (<http://www.councilscienceeditors.org>)

Todos os manuscritos submetidos para publicação são sujeitos a revisão por pares, feita de forma cega, por revisores externos ao corpo editorial, exceptuando-se os casos identificados nestas normas.

Na avaliação dos manuscritos submetidos, o editor seguirá as recomendações publicadas pelo Equator Network (em www.equator-network.org), recomendando aos autores a consulta da checklist que se adequa ao tipo trabalho a publicar.

Tem periodicidade trimestral, sendo publicada exclusivamente online a partir do número 30.

É publicada de acordo com os princípios de acesso livre. (<http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations>)

Editor e Propriedade:

A RPC é publicada e propriedade da Sociedade Portuguesa de Cirurgia

Sociedades Científicas

Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Cirurgia.

Idiomas de publicação

A RPC publica artigos redigidos em Português, Inglês, Espanhol e Francês.

Todos os manuscritos são publicados com título, resumo e palavras-chave em Inglês.

Critérios de Autoria

A RPC subscreve o “ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals” (www.ICMJE.org).

A atribuição de autoria implica a satisfação de 4 condições:

1. Ter contribuição intelectual substancial direta, no desenho e elaboração do artigo.
2. Participar na análise e interpretação dos dados.
3. Participar ativamente na escrita do manuscrito, na revisão dos rascunhos, na revisão crítica do conteúdo, ou na aprovação da sua versão final.
4. Autores concordarem que são responsáveis pela exatidão e integridade de todo o trabalho.

Todos os que contribuíram para o artigo, mas cuja participação não obedeça às condições atrás definidas, devem ser referenciados na secção "Agradecimentos".

Ser apresentado como autor não cumprindo estes critérios, é considerado má prática.

Para maior transparência, deverá ser submetido a "Declaração de Autoria e Conflito de Interesses", onde deve ser especificado o contributo de cada autor para o manuscrito apresentado e assinada por todos os autores.

Conflitos de Interesse

Todo o conteúdo publicado, incluindo as opiniões expressas, é da exclusiva responsabilidade dos autores, que devem revelar no momento da submissão a existência ou não de conflitos de interesse, na "Declaração de Autoria e Conflitos de Interesse". Essa informação será mantida confidencial durante a revisão do manuscrito e não influenciará a decisão editorial, mas será publicada caso o artigo venha a ser aceite para publicação.

No caso de existência de dúvidas relativamente ao que constitui um Conflito de Interesse devem os autores contactar o Editor Chefe (editorchefe@spcir.com).

Direitos Autorais (Copyright)

No momento da submissão do manuscrito, deve ser submetido documento assinado por todos os autores com transferência dos direitos de autor para a Revista Portuguesa de Cirurgia / Sociedade Portuguesa de Cirurgia, estando implícita a vinculação da Revista Portuguesa de Cirurgia / Sociedade Portuguesa de Cirurgia, a partir do momento de aceitação do artigo para publicação.

Se o artigo contiver extratos (incluindo ilustrações) de, ou for baseado no todo ou em parte em outros trabalhos com copyright, é da responsabilidade dos autores a obtenção da autorização escrita dos proprietários para sua reprodução em todos os territórios, edições e em todos os meios de expressão e línguas. Todos os formulários de autorização devem ser fornecidos aos editores quando da submissão do artigo.

Relativamente à utilização por terceiros de artigos publicados a Revista Portuguesa de Cirurgia rege-se pelos termos da licença Creative Commons “Atribuição – uso Não-Comercial – Proibição

de Realização de Obras derivadas (by-nc-nd)”. Informação disponível em:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pt>

A Revista Portuguesa de Cirurgia reserva-se o direito de comercialização do artigo.

Consentimento informado e aprovação ética

A publicação de fotografias, vídeos ou descrições escritas de doentes implica que os autores submetam documento de consentimento informado assinado pelo doente ou seu representante legal.

Os autores devem comunicar expressamente que o trabalho de investigação que esteve na base do artigo original foi aprovado pela Comissão de Ética da Instituição de acordo com a declaração de Helsínquia (consultar em www.wma.net) e explicita-lo na secção de material e métodos do manuscrito.

Política de Autoarquivamento

Imediatamente após a publicação *online*, os autores ficam autorizados a disponibilizar os seus artigos em repositórios institucionais, desde que mencionem a publicação onde foi publicado de acordo com as normas em vigor e utilizem ficheiro PDF original do editor.

Processo Editorial

Estilo

Os artigos devem ser escritos de acordo com o “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (<http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/icmje-recommendations/>)

O Editor reserva-se o direito de fazer alterações ao texto desde que as mesmas não desvirtuem o conteúdo, mas que adaptem o estilo de escrita ao padrão da publicação.

Submissão

Os artigos são submetidos online, por autores registados na página da Revista Portuguesa de Cirurgia em <http://revista.spcir.com/index.php/spcir/about/submissions#onlineSubmissions>

Todos os campos solicitados no sistema de submissão online devem ser preenchidos. Para desambiguação do nome do autor, sugere-se a utilização do identificador ORCID para cada autor, que poderá ser obtido em <http://orcid.org>.

No momento da submissão é definido como "Autor Correspondente", aquele que em nome de todos os co-autores, centraliza os contactos durante o processo de submissão e revisão, sendo o responsável perante o Editor por garantir que sejam cumpridos todos os requisitos para publicação do manuscrito. O seu contacto será publicado no manuscrito.

O manuscrito deve ser submetido sob a forma de documento em formato editável (.doc, .docx, .rtf). Não são aceites artigos submetidos no formato PDF, ou outro não editável.

Material muito extenso para a publicação com o artigo, designadamente tabelas extensas ou instrumentos de recolha de dados, poderão ser publicados sendo referenciado como Material suplementar.

O artigo deve seguir a seguinte estrutura:

Na primeira página:

- Título no idioma de publicação e em inglês.
- Nome de todos os Autores (primeiro e último nome) com os títulos académicos e/ou profissionais e respectivas afiliação (departamento, instituição, cidade, país).
- Subsídio (s) ou bolsa(s) que contribuíram para a realização do trabalho.
- Morada e e-mail do Autor Correspondente.

Na segunda página:

- Título
- Resumo no idioma de publicação e em inglês.
- Palavras-chave (Keywords). Um máximo de 5 utilizando a terminologia que consta no Medical Subject Headings (MeSH), <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html>.

Nas páginas subsequentes:

- Restante texto do artigo, considerando o Tipo de trabalho e a Secção da revista onde será publicado. Para que o processo de revisão do artigo seja o mais célere possível, o artigo deverá ter o texto cuidado e obedecendo aos limites impostos para o respectivo tipo de artigo.

Após submissão autor correspondente será informado por email da sua recepção, podendo consultar a evolução do processo de revisão na sua área no site da revista.

Secções e Tipos de Trabalhos

Agenda

Nesta secção serão publicitados eventos futuros de cariz técnico-científico, cujo corpo editorial considerou de relevo

Artigos de Opinião

Solicitados ou não pelo Editor Chefe, serão preferencialmente artigos de reflexão sobre educação médica, ética e deontologia médica. Devem estar estruturados com Resumo e Palavras-chave em Português e Inglês. Não poderão exceder as 2500 palavras, 2 imagens e as 5 referências bibliográficas. Não serão submetidos a revisão por pares sendo a sua aceitação para publicação da exclusiva competência do Editor Chefe.

Artigos de Revisão

Os Artigos de Revisão constituirão monografias sobre temas atuais, avanços recentes, conceitos em evolução rápida e novas tecnologias.

Os Editores encorajam a apresentação de artigos de revisão ou meta-análises sobre tópicos de interesse. Estes artigos não deverão exceder as 5000 palavras as 5 imagens e as 25 referências bibliográficas.

Os Editores poderão solicitar diretamente Artigos de Revisão, não sendo estes submetidos a revisão por pares sendo a aceitação do mesmo para publicação da exclusiva competência do Editor Chefe.

Artigos Originais

São artigos inéditos referentes a trabalhos de investigação, casuística ou que, a propósito de casos clínicos, tenham pesquisa sobre causas, mecanismos, diagnóstico, evolução, prognóstico, tratamento ou prevenção de doenças. O texto não poderá exceder as 5000 palavras e as 50 referências bibliográficas. Serão submetidos a revisão por pares.

Cadernos Especiais

Nesta secção serão publicados preferencialmente artigos a convite do Editor Chefe, focando temática designada previamente e de acordo com a orientação editorial do mesmo. Estes artigos não deverão exceder as 5000 palavras as 5 imagens e as 25 referências bibliográficas. Não serão submetidos a revisão por pares sendo a aceitação do mesmo para publicação da exclusiva competência do Editor Chefe.

Casos Clínicos

São relatos de Casos, de preferência raros, didáticos ou que constituam formas pouco usuais de apresentação.

A convite dos editores poderão ser publicados comentários ao caso.

Não deverão exceder as 1800 palavras, 4 imagens e 15 referências bibliográficas.

Serão submetidos a revisão por pares.

Controvérsias

São trabalhos elaborados a convite dos Editores. Relacionar-se-ão com temas em que não haja consensos e em que haja posições opostas ou marcadamente diferentes. Serão sempre pedidos 2 pontos de vista, defendendo opiniões opostas. O texto de cada um dos autores não deverá exceder as 2500 palavras, 2 imagens e 10 referências bibliográficas.

Editoriais

Os editoriais são apenas submetidos a convite do Editor Chefe, relacionando-se com temas da atualidade, ou com temas importantes publicados nesse número da Revista. Não serão submetidos a revisão por pares. Não têm resumo nem palavras-chave e não deverão exceder 1800 palavras tendo no máximo 5 referências bibliográficas.

Erratas e Retracções

Nesta secção serão publicadas todas as alterações ou retracções a um artigo publicado previamente e cujos erros tenham sido detectados posteriormente à sua publicação.

História e Carreiras

Nesta secção serão publicados artigos inéditos referentes a factos e figuras históricas de relevo para a Cirurgia em Portugal e no Mundo. O texto não poderá exceder as 5000 palavras e as 25referências bibliográficas. Serão submetidos a revisão por pares.

Imagens para Cirurgiões

Esta secção destina-se à publicação de imagens (clínicas, radiológicas, histológicas, cirúrgicas) relacionadas com casos cirúrgicos. O número máximo de figuras e quadros será de 3. As imagens deverão ser de muito boa qualidade técnica e de valor didático. O texto que poderá acompanhar as imagens deverá ser limitado a 250 palavras. Serão submetidos a revisão por pares.

Leituras Recomendadas

Secção onde serão publicados revisões sumárias de livros, material multimédia ou outros, que tenham particular relevância para atualização científica e técnica. Limitados a 250 palavras e 1 ilustração. Não submetido a revisão por pares.

Linhas de Orientação Recomendadas (*Guidelines*)

Nesta secção serão publicadas recomendações para a prática clínica, preferencialmente de grupos ou entidades de referência nas áreas clínicas em causa. A sua publicação depende da aprovação pelo Editor Chefe com o parecer do Editor Científico.

Passos Técnicos

Artigos com foco em técnica cirúrgica ou relativos a procedimentos cirúrgicos em que os autores apresentam e descrevem aspectos particulares da mesma com interesse pela sua inovação, resultados e reprodutibilidade. Limitado a 5000 palavras e 25 referências bibliográficas. Sem limite de ilustrações, sendo o critério de escolha final determinado pelo Editor Chefe.

Textos Fundamentais

Textos que, pela sua relevância científica, são considerados pelo Editor Chefe como relevantes para o conhecimento na área da cirurgia.

Resumos

Nesta secção serão publicados resumos de apresentações em reuniões da Sociedade Portuguesa de Cirurgia ou entidades afiliadas. Resumos dos trabalhos têm avaliação por pares.