



Guia de Consulta Terapêutica Rápida para o Farmacêutico de Oficina

Coordenação: Agostinho Almeida

Farmacêutico.

Assistente da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO

Indicações: analgésico, antipirético, anti-inflamatório e anti-agregante plaquetar (anti-trombótico).

Efeitos adversos:

- aumento do tempo de sangria
- pieira
- zumbidos
- náuseas, vômitos
- epigastralgias
- hemorragia gastro-intestinal
- úlcera péptica
- reacções alérgicas, urticária
- alterações nos testes da função hepática
- hepatite
- equimoses

Interacções e precauções:

- anticoagulantes (heparina e cumarínicos)
 - aumento do risco hemorrágico;
- vigiar tratamento quando em administração conjunta com corticosteróides pois potencia o risco de úlcera péptica;
- os antiácidos quando administrados conjuntamente podem diminuir as concentrações séricas do ácido acetilsalicílico com diminuição do efeito do último;
- a utilização conjunta com β -bloqueantes pode levar à diminuição do efeito anti-hipertensivo dos últimos;
- a utilização com fármacos inibidores da enzima de conversão da angiotensina pode levar à diminuição do efeito dos últimos;
- a utilização conjunta com alopurinol pode levar à diminuição do efeito do último;

- a utilização com bumetanida, ácido etacrínico ou furosemido pode levar à intoxicação por ácido acetilsalicílico;
- a utilização com outros anti-inflamatórios não esteróides aumenta o risco de úlcera péptica;
- a utilização com hipoglicemiantes orais potencia o efeito hipoglicemiante dos últimos;
- a utilização com insulina potencia o efeito hipoglicemiante da última;
- utilizado com metotrexato pode induzir toxicidade pelo último;
- a utilização conjunta com paracetamol, por longos períodos e doses altas aumenta o risco de lesão renal;
- a utilização com álcool e nicotina aumenta o risco de úlcera péptica;
- utilizado com vitamina C pode diminuir o efeito da última e a eliminação do ácido acetilsalicílico;
- o uso prolongado pode levar à depleção de folato.

BISACODIL

Indicações: laxante.

Efeitos adversos:

- náuseas
- vômitos
- diarreia
- cólicas abdominais
- ardor e irritação do recto
- diminuição dos níveis séricos de potássio (hipocaliémia)
- contrações involuntárias da musculatura esquelética



- distúrbios intestinais
- desequilíbrio hidro-electrolítico
- edemas dos membros inferiores
- mais raramente cefaleias, confusão mental, ardor à micção e dispneia

Interações e precauções:

- a utilização com antagonistas H₂ de histamina pode produzir irritação gástrica;
- a utilização com diuréticos pode produzir desidratação e abaixamentos perigosos dos níveis séricos de potássio;
- não utilizar mais do que uma semana - perigo de síndrome de abuso de laxantes;
- não utilizar durante a gravidez e aleitamento;
- não utilizar com antiácidos;
- não utilizar simultaneamente mais do que um laxante.

OXIMETAZOLINA

Indicações: tratamento sintomático da congestão nasal.

Efeitos adversos:

- cefaleias
- sonolência
- vertigens/tonturas
- insónia
- palpitações
- hiper e hipotensão arterial
- congestão nasal *rebound*
- irritação local devido ao uso prolongado e/ou excessivo - rinite química
- secura do nariz e da garganta

Indicações e precauções:

- a utilização com antidepressivos tricíclicos pode aumentar o efeito da oximetazolina;
- a utilização com β -bloqueantes pode diminuir o efeito de ambos os fármacos;
- a utilização com inibidores da mono-amino-oxidase (IMAOs) pode provocar aumentos bruscos e potencialmente perigosos da tensão arterial;
- a utilização com minoxidil pode diminuir o efeito do último;
- a utilização com nitratos pode diminuir o efeito de ambos os fármacos;

- a utilização com fenotiazinas pode aumentar a toxicidade da oximetazolina;
- a utilização com simpaticomiméticos pode aumentar o efeito de ambos os fármacos e produzir acções nefastas;
- a utilização com terazozina pode comprometer a eficácia da última;
- a utilização com cafeína pode causar nervosismo ou insónia.

SUCRALFATO

Indicações: gastrite e úlcera péptica.

Efeitos adversos:

- diarreia
- náuseas/vómitos
- indigestão
- secura de boca
- prurido
- vertigens/tonturas
- *rash* cutâneo
- dorsalgias
- cefaleias
- sonolência
- obstipação

Interações e precauções:

A administração conjunta de outros medicamentos deve verificar-se uma hora antes ou duas horas depois da administração do sucralfato.

Particular atenção deve ser dada à diminuição da absorção dos seguintes fármacos quando administrados conjuntamente com o sucralfato:

- antagonistas H₂ de histamina
- fenitoína (difenilhidantoína)
- tetraciclins (por exemplo, doxiciclina e minociclina)
- vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K)
- ciprofloxacina e norfloxacina

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

1. *Drug Information*. The American Formulary Service. McEvoy GK ed. American Society of Health System Pharmacists, Bethesda MD, 1995.
2. Martindale. *The Extra Pharmacopoeia*. Reynolds JEF ed., 30th ed. The Pharmaceutical Press, London, 1993.